

約4割以上の妊婦さんが無痛分娩を選択



大橋 昌尚(おおはしまさなお)先生 周産期センター長

玉野光南高校、弘前大学医学部卒業。 宝野 (大田) 日本 (日本周産期·新生児医学会新生児専門 医、麻酔科標榜医

無痛分娩に関する情報を

同院の YouTube でも公開

から麻酔を行い、 妊婦さんが痛みを訴えて


約30分

銀痛法を用いる場合も)。

可能です。

を包む外側5 ㎜程度の狭 **隙間から針を差し、** - テル挿入前に局所麻酔 効果が表れます。 、硬膜外腔(くう)に針を 硬膜外麻酔法は、カテ

入は、 産に臨めます。 ら脳脊髄液という脊髄の 膜外腔に穴が開き、穴か て行いますが、 がらリラックスして、 、細心の注意を払っ カテーテルの挿 まれに硬



身の感覚が完全になくな 押すと薬液の追加投与も を感じた際にスイッチを 妊婦さんが強い痛み 麻酔で、 下半 療を行わなくても1週間ります。通常、特別な治 程度で症状が治まります。 で頭痛が生じることがあ

麻酔科主任部長・手術センター長

倉敷古城池高校、徳島大学医学部卒業。 岡山大学麻酔科蘇生科入局後、三豊総

同山ハナ州町代解土代八周塚、三章郡 合病院、福山市民病院、川崎医科大学 附属病院などを経て2014年から倉敷成 人病センターに勤務。専門は手術麻酔 と集中治療。医学博士。日本麻酔科学

会指導医、日本専門医機構認定麻酔科

広い手術で使用されてい

れ、妊婦

赤ち

や

んを感じ

ながらお産を

硬膜外麻酔法で、

門医、麻酔科標榜医

逆子は無痛分娩ができない? 「胎児外回転術」の選択肢も

妊娠後期を迎えても逆子が続く場合、おな かの外から赤ちゃんを回転させて、逆子を元 の位置に戻す「胎児外回転術」という方法があ ります。週数が進むにつれて、自然に戻る割合



は減少するため、36週で の介入が適期です。胎児の 位置を3次元で把握し、実 施する高度な手技で、胎児 外回転術により、経腟分娩 (無痛分娩) へ移行できた 事例が多数あります。



産科 山崎 史行先生 (やまさき ふみゆき) 40年間で約2000人の 妊婦さんに胎児外回転

倉敷成人病センターで聞きました

産科・大橋 昌尚 先生 麻酔科・楠戸 和仁 先生 助産師・金只 好永 さん

「出産は痛みに耐えるのが当たり前」という考えから、今は妊婦さんにとっ て、よりよい出産方法が選べる時代になりました。年間約 1300 件(※1) という、中・四国地方でトップクラスの分娩(ぶんべん)数で、無痛分娩 に積極的に取り組む倉敷成人病センターで話しを伺いました。

白字で陣痛が

来るのを待つ

10 分間隔の陣痛

痛みに耐え子宮口

約1時間

·約 58 万円

初産婦(5泊6日の場合)

が開くのを待つ

that's

が来たら病院へ

24 時間 365 日

分娩の流れ

計画無痛分娩 妊娠 34 週ごろ 出産予定日~1週 間前を目安に希望

妊娠 10 週ごろ 医師の診察によっ て出産日を予測 の出産日を決める 出産予定日前日

(陣痛

入院 陣痛促進剤を使っ て陣痛を起こす

妊婦さんが希望し 開口 た時から麻酔開始 期 た時から麻酔開始

♥ リラックス して子宮口 が開くのを 待つ

痛くない

子宮口全開大 麻酔の効果で娩出力 が弱くなり分娩時間 が長くなる場合が 誕生

初産婦(5泊6日の場合) …約 63 万円

※無痛分娩費用5万円 を含む

母体

※出産一時金として 50 万円の補助が受けられます

痛み (陣痛) の緩和

分娩の経過 | *ナ呂取(パワリア) | パロック | パロック | からない | 麻酔によって緩みお産がスムーズに進む

産後疲労の軽減

センターでは2024年 8% (※2)。倉敷成人病 施率は2024年が13・ が約3% (※3)で341 基本的には、 今年1月~9月は約 本での無痛分娩の実

げる方法。 します。 って分娩時の痛みを和ら もあります。 すが、計画外で行うこと 望した時から麻酔を開始 無痛分娩は、 は

過ごす立会い分娩で、

幸

せな出産体験を を同室内で家族と

度まで痛みを軽減します。

分娩同様、

子宮口が全開になって

·痛·分娩·回復(LDR)

年 生児への影響はなく、赤 でおりません。胎児・新 でおりません。胎児・新 ちゃんの誕生直後、 娩と比べて約1時間長く なる傾向がありますが、 からの娩出期は、 自然分 抱っ と変わりません。 す。

っ 高いチーム医療が提供で 365日、質の は、麻酔科専門医と助産 倉敷成人病センターで

時間後には歩行もできま 過ごし方は自然分娩 産後5~6 R4 年度…1407 件 R5 年度…1317 件 R6 年度…1310 件

倉敷成人病センター調べ ※2 硬膜外無痛分娩の現状、 日本産婦人科医会調べ ※3 全経膣分娩に対する割合

硬膜外麻酔時の合併症 (頭痛など)

血圧低下、発熱などが見られる場合も ・子宮頸 (けい) 部、膣 (ちつ)、外陰部などが、・麻酔により娩出力が低下し、分娩時間が長くなる

・娩出力低下による吸引分娩、鉗子分娩の増加



メリット

金只 好永(かねただよしえ) さん 周産期センター・アドバンス助産師 1993 年助産師資格取得。同年倉敷成人病

ンター入職、周産期センター勤務。2015 アドバンス助産師資格取得 娩に導きます。

た自身が情報をしっかり かの意思決定は、妊婦さ 無痛分娩をするかどう を細やかに行い、 陣痛を感じにくくなるた 方への効きが得られる体 位にするなど、 把握して自身で決定する 公指導を行います。 麻酔が効き過ぎると、 呼吸・いきみの指導

の部屋は Wi-Fiありの

「全室個室

知識と経験に基づいた評無痛分娩の管理には、 体連絡協議会) 価が不可欠で、JALA (無痛分娩関係学会・団 が助産師です。 こも長い時間を過ごすの お産で妊婦さんともっ が定める るため、トイレの同行ない学会・団 す。また、ふらつきが出

く確認することが必須で の進行をモニターで細か ため、胎児の心拍や陣痛 進行を体感しにくくなる なり、妊婦さんが分娩の 麻酔により痛みが鈍く 合

い時期は、体を立てて下 も麻酔が効く、 にして横になると反対側 部に麻酔が効いている場 です。例えば、 把握しておくことが大切 いている範囲を助産師が 無痛分娩は、 効いている腰側を上 、片側の腰 麻酔が効 出産が近



適切な体位 知識と経験に基づい 吸の 指導 も

FMF認定医による妊娠初期の 胎児ドックのご案内

検査時期 妊娠12~13週 毎週月·水曜日 14:00~16:00 30分~1時間程度

● 初期精密超音波検査 20,000円(税込)

コンバインド検査 33,000円(税込)



下記のお電話番号へご連絡ください


紹介状をお持ちの方のご予約

患者総合支援課 地域連携 086-422-2116 受付時間 平日 8:30~18:30

診察(初診・再診・変更)のご予約

予約センター 086-422-2112 受付時間 平日 9:00~16:00

※土・日・祝日および年末年始は受付を行っておりません。 こより、回線が大変混み合うことがございます。比較的午後の方が繋がりやすくなっています



65 岡山県倉敷市白楽町250 ■ 086-422-2111 (代表)



産後ケアのご案内 補助金の当院契約市町村(倉敷市・岡山市・早島町・その他) 申込・お問合せ 周産期センター