

がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
GTT-2	メトトレキサート(MTX)+エトポシド(VP-16)+アクチノマイシン-D(ACT-D)併用療法	MEA
適応病名		
高リスク絨毛癌		
所要時間	1Course期間	
day-1 6時間 day-2~5 2時間	21日間	

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	9.9mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
2	生理食塩液50mL メトトレキサート注(MTX)	150mg/body	i.v. メイン	9時から bolus	day-1
3	生理食塩液1000mL メトトレキサート注(MTX)	300mg/body	d.i.v. メイン	9時から 4hr	day-1
4	生理食塩液50mL コスメゲン®注(ACT-D)	0.5mg/body	i.v. メイン	13時から bolus	day-1
5	5%ブドウ糖液250mL エトポシド注(VP-16)	100mg/body	d.i.v. メイン	13時から 1hr	day-1
6	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
1	生理食塩液50mL デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	15min	day-2~5
2	生理食塩液50mL コスメゲン®注(ACT-D)	0.5mg/body	i.v. メイン	bolus	day-2~5
3	5%ブドウ糖液250mL エトポシド注(VP-16)	100mg/body	d.i.v. メイン	1hr	day-2~5
4	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-2~5

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
ロイコボリン筋注	5A	i.v.	MTX投与の24hr後 から12hrおき3回	day-2,3	MTXの解毒