

がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称		略名
BR-3	ペムブロリズマブ(KEY)+エピルビシン(EPI)+シクロホスファミド(CPA)併用療法		KEY+EC
適応病名			
ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の早期乳癌			
施行区分	所要時間	1Course期間	Course数
入院・外来	2時間	21日間	4Course

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	9.9mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
2	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
3	生理食塩液50mL キイトルーダ®注(KEY)	200mg/body	d.i.v. メイン	30min	day-1
4	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
4'	生理食塩液50mL		i.v. 側管	bolus	day-1
5'	生理食塩液50mL エピルビシン注(EPI)	90mg/m ²	d.i.v. 側管	15min	day-1
6'	生理食塩液100mL エンドキサン®注(CPA)	600mg/m ²	d.i.v. 側管	30min	day-1
7'	生理食塩液50mL		i.v. 側管	bolus	day-1

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的