

# がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
URB-21	パクリタキセル(PTX)+シスプラチン(CDDP)+ゲムシタビン(GEM)併用療法	PCG
適応病名		
進行・再発尿路上皮がん		
所要時間		1Course期間
day-1 6時間 day-8 2時間強		21日間

## 実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	レスタミンコーワ錠10mg 5T		p.o.		day-1
2	ソルデム®1輸液500mL MgSO4注 KCL注	8mEq 10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
2	アロキシ®点滴静注バッグ0.75mg デキサメタゾン注 ファモチジン注20mg	9.9mg	d.i.v. 側管	bolus	day-1
3	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	2hr	day-1
3	生理食塩液250mL パクリタキセル注(PTX)	80mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. 側管	1hr	day-1
4	20%マンニトール注200mL		d.i.v. 側管	30min	day-1
5	生理食塩液300mL シスプラチン注(CDDP)	70mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	1hr	day-1
6	ソルデム®1輸液500mL KCL注	10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
6	5%ブドウ糖液100mL ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. 側管	30min	day-1
7	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1
1	ソルデム®3A輸液1000mL ※入院時のみ		d.i.v. メイン	5hr	day-2
1	レスタミンコーワ錠10mg 5T		p.o.		day-8
2	生理食塩液50mL デキサメタゾン注 ファモチジン注20mg	6.6mg	d.i.v. メイン	10min	day-8
3	生理食塩液50mL		d.i.v. メイン	30min	day-8
4	生理食塩液250mL パクリタキセル注(PTX)	80mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	1hr	day-8
5	5%ブドウ糖液100mL ジェムザール注(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	30min	day-8
6	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-8

## 支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
アプレピタントセット	1Cp	p.o.	day-1 CT開始1hr前 day-2.3 M	day-1~3	制吐
デキサメタゾン錠4mg	2T	p.o.	2×MA	day-2~5	制吐