

# がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
UTSa-4	パクリタキセル(PTX)+イホスファミド(IFM)併用療法	TI
適応病名		
進行・再発子宮肉腫(CS)		
所要時間	1Course期間	
9時間	21日間	

## 実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ソルデム®1輸液1000mL		d.i.v. メイン	4hr	day-1~3
1	ジフェンヒドラミン錠10mg 5T		p.o.		day-1
1	グラニセロン点滴静注バッグ1mg デキサメタゾン注 ファモチジン注20mg	16.5mg	d.i.v. 側管	30min	day-1
2	生理食塩液500mL パクリタキセル注(PTX)	135mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. 側管	3hr	day-1
2	グラニセロン点滴静注バッグ1mg デキサメタゾン注	12mg	d.i.v. 側管	30min	day-2,3
3	20%マンニトール注200mL		d.i.v. メイン	30min	day-1~3
4	ソルデム®1輸液1000mL 炭酸水素ナトリウム注 7% 40mL		d.i.v. メイン	4hr	day-1~3
4	生理食塩液20mL ウロミテキサン®注	320mg/m <sup>2</sup>	i.v. 側管	IFM投与直前 緩徐に	day-1~3
5	生理食塩液100mL 注射用イホマイド®(IFM)	1,600mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. 側管	bolus	day-1~3
6	生理食塩液20mL ウロミテキサン®注	320mg/m <sup>2</sup>	i.v. 側管	IFM投与4hr後 緩徐に	day-1~3
7	生理食塩液20mL ウロミテキサン®注	320mg/m <sup>2</sup>	i.v. 側管	IFM投与8hr後 緩徐に	day-1~3

## 支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	2T	p.o.	2×MT	day-4~6	制吐
ジーラスタ®注	1筒	sc		day-5	FN予防