

がん化学療法regimen登録票

| No | Regimen名称 | 略名 |
|---|---------------------------------|-----------|
| C/R-25 | セツキシマブ(Cmab)+エンコラフェニブ(ENCO)併用療法 | Cmab+ENCO |
| 適応病名 | | |
| がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸癌 | | |
| 所要時間 | 1Course期間 | |
| 2時間(初回は3時間) | 7日間 | |

実施計画

| 投与順序 | 薬品名(略号) | Dose | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 |
|------|------------------------------|--|------|--------------------|-------|
| 1 | ジフェンヒドラミン錠10mg 5T | | p.o. | | day-1 |
| 2 | 生理食塩液50mL | | メイン | 30min | day-1 |
| 3 | 生理食塩液100mL アービタックス®(Cmab) | 初回: 400mg/m ² 以降: 250mg/m ² | メイン | 初回: 2hr 以降: 1hr | day-1 |
| 4 | 生理食塩液50mL | | メイン | bolus | day-1 |
| | ビラフトビ®(ENCO) | 300mg/日 | p.o. | 夕 | 連日 |

支持療法

| 薬品名 | Dose | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 目的 |
|-----------------------------|-------------|------|------|-----|--------|
| ヒルドイド®ローション | 体幹・四肢に塗布 | | 起床時 | 連日 | 皮膚障害予防 |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション | 体幹・四肢・頭部に塗布 | | 就寝前 | 連日 | 皮膚障害予防 |
| ロコイド®クリーム | 顔面に塗布 | | 就寝前 | 連日 | 皮膚障害予防 |