

# がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称	略名
URB-2	ゲムシタビン(GEM)+カルボプラチン(CBDCA)併用療法	GCarbo
適応病名		
CDDP治療が不適な進行尿路上皮癌		
所要時間		1Course期間
day-1 2時間 day-8 1時間		21日間

## 実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
2	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
3	5%ブドウ糖液100mL ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	30min	day-1
4	5%ブドウ糖液250mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC: 4.5	d.i.v. メイン	1hr	day-1
5	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
1	生理食塩液50mL デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	15min	day-8
2	5%ブドウ糖液100mL ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	30min	day-8
3	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-8

## 支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1×M	day-2~4	制吐