

がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
BT-1	ゲムシタビン(GEM)+シスプラチン(CDDP)併用療法	GC
適応病名		
切除不能な進行胆道がん		
所要時間	1Course期間	
6時間	21日間	

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ソルデム®1輸液500mL MgSO4注 KCL注	8mEq 10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1.8
2	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1.8
2	グラニセロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. 側管	30min	day-1.8
3	5%ブドウ糖液100mL ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	d.i.v. メイン	30min	day-1.8
4	マンニトールS注200mL		d.i.v. メイン	30min	day-1.8
5	生理食塩液500mL シスプラチン注(CDDP)	25mg/m ²	d.i.v. メイン	1hr	day-1.8
6	ソルデム®1輸液500mL KCL注	10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1.8
7	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1.8

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1 × M	day-2～4 day-9～11	制吐