

# がん化学療法regimen登録票

| No                  | Regimen名称               | 略名          |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| C/R-4               | ベバシズマブ(BV)+mFOLFOX6併用療法 | BV+mFOLFOX6 |
| 適応病名                |                         | 治療順位        |
| 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 |                         | 1st/2nd     |
| 所要時間                | 1Course期間               |             |
| 50時間                | 14日間                    |             |

## 実施計画

| 投与順序 | 薬品名(略号)   | Dose                   | 投与経路          | 投与時間                              | 投与日   |
|------|---|------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|
| 1    | グラニセロン点滴静注バッグ1mg<br>アロカリス®点滴静注235mg<br>デキサメタゾン注 | 6.6mg                  | d.i.v.<br>メイン | 30min                             | day-1 |
| 2    | 生理食塩液50mL                                       |                        | i.v.<br>メイン   | bolus                             | day-1 |
| 3    | 生理食塩液100mL<br>ベバシズマブ注(BV)                       | 7.5mg/kg               | d.i.v.<br>メイン | 初回:90min<br>2回目:60min<br>以降:30min | day-1 |
| 4    | 5%ブドウ糖液250mL<br>レボホリナート注(I-LV)                  | 200mg/m <sup>2</sup>   | d.i.v.<br>メイン | 2hr                               | day-1 |
| 4'   | 5%ブドウ糖液250mL<br>オキサリプラチン注(L-OHP)                | 85mg/m <sup>2</sup>    | d.i.v.<br>側管  | I-LVと同時に<br>2hr                   | day-1 |
| 5    | 生理食塩液100mL<br>5-FU注                             | 2.400mg/m <sup>2</sup> | c.i.v.<br>メイン | 46hr                              | day-1 |
| 5'   | 5%ブドウ糖液50mL<br>5-FU注                            | 400mg/m <sup>2</sup>   | i.v.<br>側管    | c.i.v.と同時に<br>bolus               | day-1 |
| 1    | ヘパフラッシュ®100IU/mL・10mL                           |                        | i.v.<br>側管    | 緩徐に                               | day-3 |

## 支持療法

| 薬品名         | Dose | 投与経路 | 投与時間 | 投与日     | 目的 |
|-------------|------|------|------|---------|----|
| デキサメタゾン錠4mg | 1T   | p.o. | 1×M  | day-2~4 | 制吐 |