

がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称	略名
URB-1	ゲムシタビン(GEM)+シスプラチン(CDDP)併用療法	GC
適応病名		
進行尿路上皮癌		
所要時間		1 Course期間
day-1 6時間 day-8、15 1時間		28日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ソルデム®1輸液500mL MgSO4注 KCL注	8mEq 10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
2	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1
2'	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	9.9mg	d.i.v. 側管	30min	day-1
3	5%ブドウ糖液100mL ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	d.i.v. メイン	30min	day-1
4	マンニトールS注200mL		d.i.v. メイン	30min	day-1
5	生理食塩液300mL シスプラチン注(CDDP)	70mg/m ²	d.i.v. メイン	1hr	day-1
6	ソルデム®1輸液500mL KCL注	10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
7	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1
1	ソルデム®3A輸液1000mL ※入院時のみ		d.i.v. メイン	5hr	day-2
1	生理食塩液50mL デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	15min	day-8、15
2	5%ブドウ糖液100mL ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	d.i.v. メイン	30min	day-8、15
3	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-8、15

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	2T	p.o.	2 × MT	day-2～5	制吐