

がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称	略名
GA-9	ニボルマブ(NIVO)+カペシタビン(Cape)+オキサリプラチン(L-OHP)併用療法	NIVO+CapeOX
適応病名		
治癒切除不能な進行・再発の胃癌		
所要時間		1Course期間
4時間弱		21日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	3.3mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
2	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
3	生理食塩液100mL オプジーボ®注(NIVO)	360mg/body	d.i.v. メイン	30min	day-1
4	生理食塩液50mL		d.i.v. メイン	30min	day-1
5	5%ブドウ糖液250mL デキサメタゾン注3.3mg オキサリプラチン注(L-OHP)	130mg/m ²	d.i.v. メイン	2hr	day-1
6	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
	カペシタビン錠(Cape)	2000mg/m ²	p.o.	朝、夕	day-1夕～ 15朝

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1×M	day-2～4	制吐
ヒルドイド®ソフト軟膏	手掌・足裏に塗布		数回	連日	手足症候群予防