

がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称	略名
BR-18	ペムプロリズマブ(KEY)+ゲムシタビン(GEM)+カルボプラチン(CBDCA)併用療法	KEY+GC
適応病名		
PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌		
所要時間		1Course期間
day1 3時間 day8 2時間		21日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	グラニセロン点滴静注バッグ1mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	15min	day-1
2	生理食塩液50mL キイトルーダ®注(KEY)	200mg/body	d.i.v. メイン	30min	day-1
3	5%ブドウ糖液100mL ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	d.i.v. メイン	30min	day-1
4	5%ブドウ糖液250mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC:2	d.i.v. メイン	1hr	day-1
5	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
1	グラニセロン点滴静注バッグ1mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	15min	day-8
2	5%ブドウ糖液100mL ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	d.i.v. メイン	30min	day-8
3	5%ブドウ糖液100mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC:2	d.i.v. メイン	1hr	day-8
4	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-8

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的