

がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
PA-5	リポソーマルイリノテカン(nalIRI)+レボホリナート(I-LV)+5-FU持続静注療法	nalIRI+5-FU+LV
適応病名		
がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌		
所要時間	1Course期間	
48時間	14日間	

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	グラニセロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
2	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
3	生理食塩液250mL レボホリナート注(I-LV)	200mg/m ²	d.i.v. メイン	2hr	day-1
3'	生理食塩液500mL オニバイド®注(nalIRI)	70mg/m ² 50mg/m ² (※)	d.i.v. 側管	90min	day-1
4	生理食塩液100mL 5-FU注	2400mg/m ²	c.i.v. メイン	46hr	day-1
4'	生理食塩液50mL		i.v. 側管	bolus	day-1
1	ヘパフラッシュ®100IU/mL・10mL		i.v. 側管	緩徐に	day-3

※UGT1A1*6もしくはUGT1A1*28のホモ接合体、またはUGT1A1*6及びUGT1A1*28のヘテロ接合体を有する患者

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1×M	day-2~4	制吐