

がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称	略名
URG-1	ブレオマイシン(BLM)+エトポシド(VP-16)+シスプラチン(CDDP)併用療法	BEP
適応病名		
精巣腫瘍		
所要時間		1Course期間
day-1～5 6時間 day-9.16 1時間		21日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ソルデム®1輸液500mL MgSO4注 KCL注	8mEq 10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1～5
1'	グラニセロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. 側管	30min	day-1
1''	グラニセロン点滴静注バッグ1mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. 側管	30min	day-2～5
1'''	生理食塩液20mL ブレオ®注(BLM)	30mg/body	i.v. 側管	緩徐に	day-2
2	5%ブドウ糖液500mL エトポシド注(VP-16)	100mg/m ²	d.i.v. メイン	90min	day-1～5
3	マンニトールS注200mL		d.i.v. メイン	30min	day-1～5
4	生理食塩液250mL シスプラチン注(CDDP)	20mg/m ²	d.i.v. メイン	1hr	day-1～5
5	ソルデム®1輸液500mL KCL注	10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1～5
6	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1～5
1	ソルデム®3A輸液200mL		d.i.v. メイン	1hr	day-9.16
1'	生理食塩液20mL ブレオ®注(BLM)	30mg/body	i.v. 側管	緩徐に	day-9.16

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	2T	p.o.	2 × MT	day-6～8	制吐